

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

GAVISCON

N O U R R I S S O N

Suspension buvable en flacon

Alginate de sodium/Bicarbonate de sodium

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que GAVISCON NOURRISSON, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GAVISCON NOURRISSON, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON ?
3. Comment utiliser GAVISCON NOURRISSON, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GAVISCON NOURRISSON, SUSPENSION BUVABLE EN FLACON ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTIREFLUX

ANTIACIDE

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est indiqué dans le traitement du reflux gastro-oesophagien qui se traduit par des régurgitations et des épisodes de vomissements après les repas.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon ?

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi :

En cas de régime sans sel, ou pauvre en sel, tenir compte de l'apport de sodium (14,5 mg par ml)

En cas d'utilisation simultanée avec des épaississants, il est recommandé de bien respecter le mode d'emploi préconisé pour l'épaississant et les posologies indiquées pour chaque produit.

Parallèlement à l'emploi de ce médicament, il est recommandé de suivre certaines règles hygiéno- diététiques :

- Épaissir l'alimentation,
- Éviter les bouillies chocolatées
- Fractionner les repas
- Éviter de trop serrer les couches
- Éviter le tabagisme familial
- Supprimer le jus d'orange et les boissons gazeuses

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Par précaution, il est préférable d'espacer les prises de 2 heures entre ce médicament et un autre médicament.

Informations importantes concernant certains composants de GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon :

Liste des excipients à effet notoire : Sel de sodium

3. COMMENT UTILISER GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon ?

Posologie

Votre médecin prescrira GAVISCON selon le poids de votre enfant et son nombre de repas.

La posologie habituelle est de 1 à 2 ml/kg/ jour.

- de 0 à 1 mois : 1 ml après chacun des 6 repas
- de 1 à 2 mois : 1,5 ml après chacun des 5 repas
- de 2 à 4 mois : 2 ml après chacun des 5 repas
- de 4 à 18 mois : 2,5 ml après chacun des 4 repas
- au-delà de 18 mois : 5 ml après chacun des 4 repas

Mode d'administration

Ce médicament doit être pris par voie orale, non mélangé au lait ou aux aliments.

Bien agiter le flacon avant l'emploi.

La pipette est graduée en ml. La dose par prise

correspond à la dose administrée après chaque repas.

La première manipulation de la pipette ne permet pas de

restituer la dose souhaitée. Le fait de remonter ou de

redescendre la pipette avant d'effectuer le premier

prélèvement permet d'éviter ce phénomène.


Démonter le piston du corps de la seringue. Rincer puis

sécher soigneusement la pipette après chaque utilisation.

Remonter le piston dans le corps de la seringue, puis la

replacer dans son fourreau.

Schéma d'utilisation de la pipette :



Fréquence d'administration

GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon doit être pris après les repas.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Constipation éventuelle
- En cas d'utilisation prolongée, risque d'augmentation du taux de calcium dans le sang.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon ?

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Ne pas utiliser GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou le flacon.

Ne pas conserver au-delà de 30 jours après première ouverture du flacon.

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C

Ne pas conserver au réfrigérateur.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon ?

Les substances actives sont :

Alginate de sodium.....5,000 g
Bicarbonate de sodium.....2,670 g
Pour 100 ml

Les autres composants sont :

carbonate de calcium, carbomère, saccharine sodique, arôme fenouil, arôme banane, hydroxyde de sodium, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), eau purifiée

Qu'est ce que GAVISCON NOURRISSON, suspension buvable en flacon ?

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable. Flacon de 150 ml.

Titulaire

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

DANSOM LANE

HU8 7DS HULL

Royaume-uni

Exploitant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

15, RUE AMPÈRE

91748 MASSY CEDEX,

FRANCE

Fabricant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LTD

KINGSTON WORKS

DANSOM LANE


HULL

EAST YORKSHIRE HU8 7DS

ROYAUME-UNI

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 10 avril 2007.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Gaviscon et  sont des marques déposées.

