DESOMEDINE® 0,1% collyre en flacon
Di-iséthionate d'hexamidine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DESOMEDINE 0,1%, collyre et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DESOMEDINE 0,1%, collyre ?
3. Comment utiliser DESOMEDINE 0,1%, collyre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DESOMEDINE 0,1%, collyre ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DESOMEDINE 0,1%, COLLYRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est une solution pour instillation dans l'œil.
Il est préconisé dans les infections bactériennes de l'œil et de ses annexes : conjonctivites, kératoconjonctivites, blépharites, dacryocystites.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DESOMEDINE 0,1%, COLLYRE ?

N'utilisez jamais DESOMEDINE 0,1%, collyre dans le cas suivant :
En cas d'allergie (hypersensibilité) à l'un des constituants.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.

Faites attention avec DESOMEDINE 0,1%, collyre

Mises en garde spéciales :

En l'absence d'amélioration rapide ou en cas d'apparition de symptômes nouveaux tels que rougeur ou douleur de l'œil ou troubles de la vision, arrêter le traitement et contacter votre médecin.

Précautions d'emploi :

- Ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.
- Refermer soigneusement le flacon après usage.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.
D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Immédiatement après utilisation, il se peut que votre vision soit troublée. Faites attention si vous conduisez des véhicules ou si vous utilisez des machines.

3. COMMENT UTILISER DESOMEDINE 0,1%, collyre ?

Posologie / Mode d'administration / Fréquence d'administration

2 gouttes 4 à 6 fois par jour.

Durée du traitement

Traitement limité à 10 jours. Au-delà, la conduite à tenir devra être réévaluée.

Si vous avez pris plus de DESOMEDINE 0,1%, collyre que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DESOMEDINE 0,1%, collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Irritation transitoire et réactions allergiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DESOMEDINE 0,1%, collyre ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser DESOMEDINE 0,1 %, collyre après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 30 jours après ouverture du flacon.
Noter la date d'ouverture en clair sur l'emballage.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient DESOMEDINE 0,1%, collyre ?

La substance active est :

Di-isétionate d'hexamidine..... 100,0 mg

Pour 100 ml de solution

Les autres composants sont :

Chlorure de sodium, acide borique, borax, eau purifiée.

Qu'est ce que DESOMEDINE 0,1% et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre en flacons multidoses rebouchables de 0,6 ml.
Boîte de 10.

Titulaire et Exploitant

LABORATOIRE CHAUVIN
416 rue Samuel Morse
34000 MONTPELLIER - FRANCE

Fabricant

LABORATOIRE CHAUVIN
ZI Ripotier Haut
07200 AUBENAS - FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : Janvier 2011

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France)

Laboratoire CHAUVIN
416 rue Samuel Morse
34000 MONTPELLIER- France

Information médicale: 04.67.12.30.30

®/™ signifie que le nom de marque appartient à Bausch & Lomb ou à l'une de ses filiales.
© Bausch & Lomb *incorporated*

3340400 087E04-0111

BAUSCH + LOMB