

## COMPOSITION

Nitrate d'éconazole..... 1g  
Excipients : palmitostéarate d'éthylène glycol et de polyoxyéthylène glycols, glycérides polyglycolysés insaturés, paraffine liquide légère, acide benzoïque, butylhydroxyanisole, parfum, eau purifiée. q.s.p..... 100 g  
Tube de 30 g.

**Titulaire et exploitant : Merck Médication Familiale – 18C Bd Winston Churchill – 21070 DIJON**

Fabricant : FAMAR – 29, avenue Charles de Gaulle – 69230 SAINT GENIS LAVAL

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : ANTIFONGIQUE LOCAL (D : Dermatologie)

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est une crème pour application locale contenant un antifongique de la famille des imidazolés. Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées dues à des champignons (mycoses).

## ATTENTION ! DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

◆ Si vous êtes hypersensible (allergique) à la substance active ou à l'un des excipients contenus dans MYCOAPAIISYL 1%, crème.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

◆ Eviter les applications près des yeux,

◆ En cas d'application chez l'enfant, sur une grande surface ou sur une peau lésée, respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquée par votre médecin ou votre pharmacien (en raison de la pénétration plus importante du produit dans ces circonstances).

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE PHARMACIEN OU A VOTRE MEDECIN.

## COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

### MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

#### Adulte, enfant, nourrisson.

Usage local. Appliquer sur les régions atteintes et leur périphérie 2 fois par jour, après toilette et séchage de la peau. Faire suivre l'application d'un massage doux et régulier jusqu'à pénétration complète.

### DUREE DU TRAITEMENT

La durée du traitement est de 2 à 4 semaines selon la mycose, elle peut être plus longue pour certaines localisations. L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

## INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Si vous oubliez d'utiliser MYCOAPAIISYL 1%, crème : n'utilisez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié d'utiliser.

## EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tout produit actif, MYCOAPAIISYL 1%, crème peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

◆ démangeaisons, irritations, sensations de brûlure, rougeurs.

SIGNEZ A VOTRE PHARMACIEN OU A VOTRE MEDECIN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

DATE DE DERNIERE REVISION DE LA NOTICE : OCTOBRE 2002



En France Métropolitaine, Merck Médication Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Merck Médication Familiale vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

3100021

