

COMPOSITION

Poudre pour application cutanée

La substance active est : Nitrate d'éconazole 1g pour 100 g de poudre pour application cutanée.

Les autres composants sont : talc, silice colloïdale anhydre, oxyde de zinc léger.

Flacon de 20 g

Titulaire et exploitant : Merck Médication Familiale - 18C Bd Winston Churchill - 21070 DIJON

Fabricant : FAMAR - 29, Avenue Charles de Gaulle - 69230 Saint Genis Laval

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : ANTIFONGIQUE LOCAL (D : Dermatologie)

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est une poudre pour application cutanée contenant un antifongique de la famille des imidazolés.
Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées
dûes à des champignons (mycoses).

ATTENTION ! DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans le cas suivant :

- ◆ Si vous êtes hypersensible (allergique) à la substance active ou à l'un des excipients contenus dans MYCOAPAISYL 1%, poudre.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Eviter les applications près des yeux et sur les muqueuses génitales.
- ◆ En cas d'application chez l'enfant, sur une grande surface, ou sur une peau lésée, respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquée par votre médecin ou votre pharmacien en raison de la pénétration plus importante du produit dans ces circonstances.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE PHARMACIEN OU A VOTRE MEDECIN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?**MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE****Adulte, enfant et nourrisson.**

Usage local. Poudrer les régions atteintes et leur périphérie 2 fois par jour, après toilette et séchage de la peau.

DUREE DU TRAITEMENT

La durée du traitement est de 2 à 4 semaines selon la mycose, elle peut être plus longue pour certaines localisations. L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tout produit actif, MYCOAPAISYL 1%, poudre peut, chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants :

- ◆ Démangeaisons, irritations, sensations de brûlure, rougeurs.

SIGNEZ A VOTRE PHARMACIEN OU A VOTRE MEDECIN TOUT EFFET NON SOUHAITES ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DATE DE PEREMPTION

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

DATE DE DERNIERE REVISION DE LA NOTICE : Octobre 2002



En France Métropolitaine, Merck Médication Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Merck Médication Familiale vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

