



Oligosol

Lithium

Composition

pour une ampoule de 2 ml
GLUCONATE DE LITHIUM 8,140 mg
Excipient à effet notoire : glucose.
Autre excipient : eau purifiée.

côté à ouvrir 

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable en ampoule de 2 ml, boîte de 28.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE : OLIGOTHÉRAPIE (V : divers)

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours de manifestations psychiques ou psychosomatiques mineures de l'enfant de plus de 6 ans et de l'adulte (troubles légers du sommeil, irritabilité).

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant : antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

Mises en garde spéciales

Certains troubles du caractère ou du comportement nécessitent des posologies importantes de lithium. Le lithium sous forme d'oligoélément n'a pas de place dans le traitement de ces troubles.

Chez l'enfant, un trouble du comportement ou un trouble du sommeil nécessite une consultation auprès de votre médecin.

Précautions d'emploi

Lithium Oligosol ne doit généralement pas être utilisé au cours de la grossesse (cf. rubrique Grossesse et Allaitement).

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

En cas d'allaitement, éviter de prendre ce médicament. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Posologie : • Adulte : 2 à 4 ampoules par jour
• Enfant : 1 à 2 ampoules par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

L'administration par voie sublinguale est recommandée.

Les ampoules sont à prendre :

- de préférence le soir au coucher,
 - éventuellement 15 minutes avant un repas ou le matin à jeun.
- Garder le contenu de l'ampoule 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avaler.

Posologie



matin



midi



soir

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS. SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur ce conditionnement. À conserver à une température inférieure à 25° C.

Date de révision de la notice : Juillet 2006.



LOT: 7502/1
EXP: DEC 16



NE PAS LAISSER À LA PORTÉE
NI À LA VUE DES ENFANTS.
MÉDICAMENT AUTORISÉ N° 3400937546621.



* 3 7 5 4 6 6 2 *