Oligosol

Magnésium

Composition
pour une ampoule de 2 ml
GLUCONATE DE MAGNÉSIUM ..... 1,781 mg
Excipient à effet notoire : glucose.
Autre excipient : eau purifiée.

côté à ouvrir

FORME PHARMACEUTIQUE
Solution buvable en ampoule de 2 ml, boîte de 28.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE : OLIGOTHÉRAPIE (V : divers)

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT
Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états de dystonie neurovégétative et d'états regroupés sous le terme de spasmophilie.

ATTENTION !
Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament
Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant : antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement
D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT
RÉSERVÉ À L'ADULTE.
Posologie : 1 à 3 ampoules par jour.

Mode et voie d'administration
Voie orale.
L'administration par voie sublinguale est recommandée.
Les ampoules sont à prendre :
- de préférence le matin à jeun,
- éventuellement 15 minutes avant un repas ou le soir au coucher.
Garder le contenu de l'ampoule 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avaler.

Posologie

matin

midi

soir

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS
CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS. SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ.

CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur ce conditionnement.
À conserver à une température inférieure à 25° C.

Date de révision de la notice : Décembre 1997.

LOT : 7517/1
EXP : MAR 12

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE NI À LA VUE DES ENFANTS.
MÉDICAMENT AUTORISÉ N° 3400937546850.