

Drill

sans sucre

pamplemousse pastille

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours de traitement, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille ?
3. Comment prendre DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaceutique :
ANTISEPTIQUE LOCAL/ANESTHESIQUE LOCAL
(R02A : préparation pour la gorge).

Ce médicament est préconisé en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

NB : devant les signes cliniques généraux d'infection bactérienne, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille ?

Ne prenez jamais DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille :

- chez l'enfant de moins de 6 ans,
- si vous êtes allergique aux anesthésiques locaux, à la chlorhexidine ou aux autres composants contenus dans ce médicament.

Faites attention avec DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille :

L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses

routes (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif :

- de n'utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans,
- de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.

Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux avec la possibilité de convulsions et sur le cœur. L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

Mal de gorge : En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Aphtes, petites plaies de la bouche :

En cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre, CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

NE PAS LAISSER CE MEDICAMENT A LA PORTEE NI A LA VUE DES ENFANTS.

Prise d'autres médicaments : N'utilisez pas en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

Aliments et boissons : Les pastilles ne doivent pas être prises avant les repas ou avant la prise de boisson.

Grossesse et allaitement :

Grossesse : Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement : L'utilisation de ce médicament est à éviter en cas d'allaitement.

Ne prenez pas de médicament pendant la grossesse ou l'allaitement sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Sportifs : L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (la tétracaine) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été observé.

3. COMMENT PRENDRE DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille ?

Posologie : Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Adulte : 1 pastille à sucer 4 fois par 24 heures

Enfant de 6 à 15 ans : 1 pastille à sucer 2 à 3 fois par 24 heures

Voie d'administration: voie buccale

Fréquence d'administration : Les prises doivent être espacées au moins de 2 heures.

Durée du traitement : La durée d'utilisation est limitée à 5 jours. En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.



Si vous avez pris plus de DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille que vous n'auriez dû :

Pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament peut passer dans la circulation sanguine et risque d'avoir des effets sur le cœur et sur le système nerveux entraînant de possibles convulsions.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE pastilles, est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- éruptions cutanées : dans ce cas, arrêtez le traitement,
- possibilité d'engourdissement passager de la langue,
- en cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaloir de travers ») il est conseillé d'interrompre le traitement et de demander l'avis d'un médecin.
- une coloration brune de la langue ; elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement,
- une coloration des dents peut également survenir ; elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille ?

Les substances actives sont : Diguconate de chlorhexidine 3,00 mg. Chlorhydrate de tétracaïne 0,20 mg. Pour une pastille de 2,5 g

Les autres composants sont : Arôme de pamplemousse rose SN715427 (terpène d'orange, terpène de pamplemousse, substances aromatisantes naturelles, alphanatocophérol E307), arôme de menthe poivrée 13571016 (huile essentielle d'anis étoilé, huile essentielle de clou de girofle, huile essentielle de menthe poivrée, L-menthol, huile essentielle de menthe des champs), glycyrrhizate d'ammonium, acésulfame potassique, isomalt.

Voie buccale

Qu'est ce que DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE, pastille et contenu de l'emballage extérieur ?

Les pastilles DRILL SANS SUCRE PAMPLEMOUSSE sont des pastilles rondes de couleur blanche. Elles sont disponibles sous plaquettes thermoformées dans des étuis de 24 pastilles.

Titulaire/Exploitant : PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, place Abel-Gance
92100 Boulogne.

Fabricant : PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45, place Abel-Gance
92100 Boulogne.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Janvier 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Information médicale Tél : 0800 95 05 64



Pierre Fabre



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.