

# CliptolGel

Ibuprofène 5%, Lévo menthol 3%

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que CLIPTOL, gel et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CLIPTOL, gel?
3. Comment utiliser CLIPTOL, gel?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver CLIPTOL, gel?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE CLIPTOL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

TOPIQUE POUR DOULEURS ARTICULAIRE ET MUSCULAIRE.

Ce médicament est préconisé chez l'adulte (plus de 15 ans) en traitement de courte durée des traumatismes bénins: entorses bénignes (foulures), contusions, traumatismes sportifs.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER CLIPTOL, gel?

- En cas d'antécédents rénaux, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MÉDECIN. Ce médicament peut aggraver une insuffisance rénale préexistante.
- **Si effets indésirables sont réduits en utilisant la dose minimale efficace, le moins longtemps possible. RESPECTEZ LA POSOLOGIE.**
- Bien se laver les mains après chaque utilisation, sauf si elles font parties de la zone à traiter.

**Ne pas utiliser CLIPTOL, gel dans les cas suivants:**

- à partir du 6<sup>e</sup> mois de la grossesse,
- antécédents d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise d'ibuprofène ou de substances d'activité proches telles que autres AINS, aspirine,
- antécédent d'allergie au lévomenthol ou à l'un des excipients,
- sur une peau lésée, quelle que soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie,
- en association avec un autre topique sur la même zone douloureuse.

**Prendre des précautions particulières avec CLIPTOL, gel:**

- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.
- L'apparition d'une éruption cutanée, après application du gel, impose l'arrêt immédiat du traitement.
- Ne pas utiliser sous pansement occlusif.
- En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement ou en cas d'aggravation, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
- Le médicament contient du propylène glycol et peut induire des irritations de la peau.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments:**

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

**Grossesse et allaitement (par extrapolation avec la voie orale):**

Ce médicament ne sera utilisé pendant les 5 premiers mois de la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

A PARTIR DU 6<sup>e</sup> MOIS DE GROSSESSE, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

En cas d'allaitement, l'utilisation de ce médicament est à éviter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Informations importantes concernant certains composants de CLIPTOL, gel:**

Ce médicament contient du propylène glycol.

## 3. COMMENT UTILISER CLIPTOL, gel?

Ce médicament est réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

Pour les tubes de 20, 30 ou 50 g, appliquer environ 10 à 40 mm de gel par prise.

Pour le tube de 15 g, appliquer 40 à 100 mm de gel par prise.

Voie locale.

USAGE EXTERNE.

Appliquer le gel sur la zone douloureuse et masser légèrement jusqu'à absorption.

**Pierre Fabre**  
**HEALTHCARE**

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

En moyenne, 1 application 2 à 3 fois par jour, en respectant un minimum de 4 heures entre chaque application. Ne pas dépasser 3 applications par jour. En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement ou en cas d'aggravation, **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

**Si vous avez utilisé plus de CLIPTOL, gel que vous n'auriez dû :**

Rincer abondamment à l'eau.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez d'utiliser CLIPTOL, gel :**

Ne pas appliquer une dose de CLIPTOL, gel supérieure pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CLIPTOL, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Peuvent survenir des réactions allergiques :

- Cutanées : éruption, démangeaisons, urticaire, rougeurs, dessèchement de la peau, sensations de brûlures, dermatite et moins fréquemment un décollement de la peau pouvant s'étendre rapidement de façon grave à tout le corps,
- Respiratoires : asthme, gêne respiratoire,
- Générales : brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke).

**Dans tous les cas, arrêter immédiatement le traitement et consulter votre médecin.**

D'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent survenir. Ils sont fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée de traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

**Dans tous les cas, avertir votre médecin.**

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.

Site internet : [www.anism.sante.fr](http://www.anism.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER CLIPTOL, gel ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte ou sur le tube. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament est à conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient CLIPTOL, gel ?**

**Les substances actives sont :**

Ibuprofène .....	5,0 g
Lévomenthol .....	3,0 g
Pour 100 g de gel.	

**Les autres composants sont :**

Propylène glycol, di-isopropanolamine, carbomère 980, éthanol à 96 pour cent, eau purifiée.

**Qu'est-ce que CLIPTOL, gel et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de gel. Tube de 15, 20, 30, 50 g. Boîte de 1.

Ce gel est incolore exempt de particules visibles avec une odeur de menthe. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire**

**PIERRE FABRE MEDICAMENT** - 45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne

**Exploitant**

**PIERRE FABRE MEDICAMENT** - 45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne

**Fabricant**

**PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION**

ETABLISSEMENT PROGIPHARM - Rue du Lycee - 45502 Gien Cedex

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est janvier 2015.**

**Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'ANSM (France).**

  
**Pierre Fabre**  
Consumer Health Care  
UNE DIVISION PIERRE FABRE MEDICAMENT



VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE CONSIGNES POUVANT VARIER LOCALEMENT > [WWW.CONSIGNESDETRI.FR](http://WWW.CONSIGNESDETRI.FR)